



Triagering på Hälsocentral för att minska risk för smittspridning

Alla patienter ska hanteras som potentiellt smittsamma.

Åtgärder som kan minska risken för smittspridning generellt

- Så kort vistelse i väntrum som möjligt
- Möblera med så stort avstånd som möjligt
- Möbler bör vara avtorkningsbara och rengöras kontinuerligt (vid nyinköp är det ett krav att möbler ska vara avtorkningsbara)
- Leksaker bör minimeras, om det finns ska de rengöras med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. Rutin för vem som ansvarar för rengöring/desinfektion ska finnas.

Triageringsfrågor för att urskilja patienter med högre smittrisk

Frågorna ska alltid ställas vid bokning av besök om besöket sker samma dag annars vid ankomst.

Har Du något av följande:

- Nyttillkomna luftvägssymptom i form av hosta eller snuva?
- Nyttillkomna kräkningar eller diarré
- Utslag och feber?
- Känt bärarskap av någon smittsam sjukdom som riskerar att smitta andra såsom MRSA?

Vid Luftvägssymtom covid-19, influensa, kikhosta eller RS-virus

- Patienten tas till rum genom direktgång utifrån om detta finns annars möts patienten upp och tas direkt in på rum.
- Patienten rekommenderas bära munskydd. Om detta inte är möjligt bär personalen munskydd och visir.
- Avstånd på 2 meter bör alltid eftersträvas när så är möjligt.



Vid misstänkt smittsam diarré och/eller kräkning

Ex Vinterkräksjuka, Clostridioides difficile

- Patienten med kräkning tas till rum genom direktingång utifrån om detta finns annars möts patienten upp och tas direkt in på undersökningsrum.
- Egen toalett bör finnas, denna städas med virkon efter användning.
- Vid pågående kräkning bör personal bära munskydd.

Ett undersökningsrum med direktingång utifrån med egen toalett bör finnas. Detta ska det alltid planeras för vid om- eller nybyggnad.

Luftburen smitta: Ex TB, mässling eller vattkoppor

- Andningsskydd FFP3 ska bäras vid misstänkt tuberkulos (TB).
- Personal som inte har immunitet, dvs genomgången infektion/vaccination av vattkoppor eller mässling ska bära andningsskydd FFP3.
- Patienter med misstänkt luftburen smitta bör inte komma in på hälsocentralen. Om möjligt gör i stället hembesök, undersök utomhus eller remittera direkt till Infektionsmottagningen.