



Handläggning av nyupptäckt MRSA hos patient

Bakgrund

MRSA är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen (SmL).

För att förebygga smittspridning ska alla nya fall följas upp och ges information och förhållningsregler. I samband med det ska smittspårning genomföras.

Initial handläggning av nyupptäckt MRSA i primärvård

1. Behandlande läkare ska informera patienten om MRSA-fyndet och ge muntlig och skriftlig information om förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Förhållningsregler finns under rubriken "MRSA" i [smittskyddsläkarföreningens patient- och läkarinformation](#).
2. Behandlande läkare ska göra smittskyddsanmälan enligt Smittskyddslagen. MRSA-infektion och MRSA-bärarskap räknas som allmänfarlig sjukdom.
3. Läkare vid Barn- alternativt Infektionskliniken bör kontaktas inför eventuell antibiotikabehandling.
4. Behandlande läkare aktiverar uppmärksamhetsymbolen i patientjournalen.
5. Alla MRSA-bärare i Region Jämtland Härjedalen remitteras till Infektionskliniken/ Barnkliniken där de tilldelas en patientansvarig läkare, **MRSA-PAL**, som ansvarar för uppföljning vilket bland annat innefattar smittspårning och fortsatt handläggning. Vid långa avstånd eller när det är praktiskt svårt kan en MRSA-PAL på patientens hälsocentral utses. Rutiner som ska följas vid uppföljningen, oavsett på vilken klinik det görs, finns under rubriken "Uppföljning av nyupptäckt MRSA i Region Jämtland Härjedalen".

Initial handläggning av nyupptäckt MRSA i slutenvård

1. Behandlande läkare ska informera patienten om MRSA-fyndet och ge muntlig och skriftlig information om förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Förhållningsregler finns under rubriken "MRSA" i [Smittskyddsläkarföreningens patient- och läkarinformation](#).
2. Behandlande läkare ansvarar för att åtgärder vidtas som minimerar smittspridning. Det innebär bl.a. isolering på enkelrum och säkerställa god följsamhet till basala hygienrutiner. Lokala anvisningar finns på [Vårdhygiens hemsida](#), se rubriken "Multiresistenta bakterier - MRSA", "Rutiner för vård av

- patient med MRSA". I vissa fall är det motiverat att patienten vårdas på infektionsklinik.
3. Behandlande läkare ansvarar i samarbete med infektionskonsult/barnkonsult för att patienten får adekvat behandling vid eventuell klinisk MRSA-infektion.
 4. Den behandlande läkaren är, i samarbete med Smittskydd & Vårdhygien, ansvarig för att initiera smittspårning bland medpatienter och vårdpersonal.
 5. Behandlande läkare gör anmälan enligt smittskyddslagen.
 6. Behandlande läkare ska remittera patienten till Infektionskliniken alternativt Barnkliniken. Alla MRSA-bärare i Region Jämtland Härjedalen tilldelas en patientansvarig läkare en s.k. MRSA-PAL på Infektionskliniken eller Barnkliniken.
 7. Bärarskap dokumenteras av behandlande läkare i patientjournalen under uppmärksamhetssymbolen.