

## Lathund inför vaccination av vuxna mot mässling


### Kontraindikation mot mässlingsvaccination (MPR):

- ✓ **Graviditet** – ordna med vaccination efter graviditeten – inför återgång i arbete. Graviditet bör undvikas under 1 månad efter vaccination. Kvinnor som planerar att bli gravida bör rådas att vänta med vaccination. Amning inget hinder.
- ✓ **Mycket svår äggallergi/ allergi mot vaccinkomponenter** – tag en serologi för att kontrollera immunitet mot mässling (skickas till mikrobiologen, Umeå, remiss med rosa kant), om ej immun, remiss till infektionskliniken för bedömning.
- ✓ **Nedsatt immunförsvar av sjukdom eller behandling** – tag en serologi (se ovan) för att kontrollera immunitet mot mässling, om ej immun, remiss till infektionskliniken för bedömning om vaccination kan ske.
- ✓ **Pågående infektion med feber över 38,5** – vaccinera när tillfrisknad.
- ✓ **Andra levande vacciner:** Om vaccinerna inte ges samtidigt rekommenderas ett intervall på minst 1 månad mellan administrering av MPR och andra levande försvagade vacciner.
- ✓ **Blod, plasma och gammaglobulinpreparat** innehåller antikroppar mot mässling. Därför bör man vänta tre månader innan MPR ges för att vaccinet ska ge full effekt.

### Lathund inför ställningstagande till mässlingsvaccination

Födelseår	Vilka bör vaccineras
Före 1960	Av de som uppger att de <b>INTE</b> haft mässling och inte är vaccinerade, har 95% immunitet mot mässling. Avrådes från MPR. Om ändå önskemål finns ej fel att ge en dos MPR <sup>1</sup> .
1960–1980	De som <b>inte är vaccinerade x2</b> och <b>inte har haft</b> mässling (eller inte vet)
1981 och senare	De som <b>INTE</b> följt svenskt barnvaccinationsprogram. De som är uppvuxna utanför Sverige, bör vaccineras om de inte vet att de fått 2 doser

**Bland de som är aktuella för vaccination:** De som fått 1 dos vaccin, vaccineras med **1 dos**. De som inte fått någon dos vaccineras med **2 doser med minst en månads mellanrum**. Vid osäkerhet är det inte fel eller farligt (om det inte finns någon kontraindikation, se ovan) att ge en dos MPR.



<sup>1</sup>För den som inte har kvar sitt vaccinationskort och inte kommer ihåg om de vaccinerats eller haft sjukdomen kan vaccination ske utan föregående immunitetskontroll. Serologi för att kontrollera immunitet tas bara om det finns kontraindikation för vaccination