

# Städschema för hälsocentraler och mottagningar

**Inledning:** städning minskar mängden smuts och mikroorganismer i miljön och är tillsammans med basala hygienrutiner och punktdesinfektion grundläggande för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

**Rum:** behandlings och undersökningsrum

	Punktdeinfektion vid spill av kroppsvätskor	Städ/rengöring mellan varje patient
		Ytor *
Allmänt städ	Alkoholbaserat ytdeinfektionsmedel med tensid	Alkoholbaserat ytdeinfektionsmedel med tensid Om britspapper används och inget synligt spill på britsen räcker det att torka britsen en gång dagligen. Gynstol + benstöd torkas mellan varje pat.
Multiresistenta bakterier	Alkoholbaserat ytdeinfektionsmedel med tensid	Alkoholbaserat ytdeinfektionsmedel med tensid <b>MRSA</b> bärare: vid risk för att hudflagor spridits i undersökningsrummet, eller barn som är snoriga ska ytor som kan ha förorenats rengöras och desinfekteras med Virkon®/Perform®.

\* Med ytor avses: ytor som patienten eller material som varit i kontakt med patienten ex. brits, gynstol, provtagningsstol, bord, bänkar, vagnar.

**Punktdeinfektion:** vid spill av kroppsvätskor, så som ex. blod, urin, avföring, kräkning, slem. Torkas upp med papper och därefter desinfektionsmedel enl. ovan.

**Dagligen:** undersökningsbritsen torkas med alkoholbaserat ytdeinfektionsmedel. Golvet tormoppas. Om fläckar, torka med fuktmopp.